

Notas entomológicas

POR

EL R. P. LONGINOS NAVÁS, S. J.

XIII

*Sobre una pequeña colección de Neurópteros de Italia.
reunida por el profesor Felipe Silvestri, de Portici.*

Por lo que pueda ser útil para el conocimiento de la fauna neuropterológica, daré á conocer el resultado de mis investigaciones sobre una pequeña colección de Neurópteros, formada casi en su totalidad el verano pasado de 1905, por el distinguido naturalista profesor Silvestri, de Portici, quien tuvo la amabilidad de enviármela para su determinación, ofreciéndome á la par galantemente de los duplicados. Y si bien las más de las especies ofrecen poco interés por tener un área muy extendida, otras, en cambio, son bastante raras, y alguna forma no citada todavía en Italia.

Libellula depressa L., Portici, Tempio Junio, 1905.

Crocothemis erythraea Brull., Portici.

Sympetrum Fonscolombei Sel., Portici.

— *striolatum* Charp., Portici.

Orthetrum brunneum Fonsc., Civerrano, Agosto, 1905.

— *cancellatum* L., Portici. Un ejemplar ♀. Es especie bastante local y más rara que las anteriores, las cuales suelen verse donquiera.

Aeschna mixta Latr., San Vito, Julio, 1905. 16 Agosto 1905.

Calopteryx hæmorrhoidalis Van der Linden., Nicastro. Septiembre, 1905.

Lestes barbara F., Portici.

— *Dryas* Kirby., Portici.

Agrion Lindenii Sel., Portici. Especies frecuentes, más raras la *Dryas*.

Ascalaphus italicus F., San Vito di Norm. Mayo, 1905. Varios ejemplares típicos, uno de alas más pálidas.

Palpares libelluloides L., San Vito di Norm. 2 Jun. 1905. Nicastro. Agosto, 1905.

Macronemurus appendiculatus Latr., Nicastro. 5 Agosto, 1905.

Formicaleo tetragrammicus F., San Vito di Norm. 24 Junio 1905.

Creagrís plumbeus Oliv., Torre del Greco, Junio, 1905.

Myrmeleon nemausiensis Borkh., Nicastro. 10 Agosto 1905. Notable hallazgo que extiende el área de esta especie circunmediterránea.

Nemura variegata Oliv., Bevagna.

Chrysopa vulgaris Schn. Muchos ejemplares. San Vito, 2 Junio 1905. Nicastro, Julio, 1905.

— *vulgaris* var. *radialis* Navás. Parece nueva para Italia, y es muy rara aun donde abunda la forma típica.

— *clathrata* Schn., San Vito, 16 Junio 1905.

— *perla* L., San Vito, Serranova, 23 Mayo 1905. Nicastro, Baratta. 2 Mayo, 1905.

— *prasina* Burm., Nicastro, Septiembre, 1905.

— *Genei* Ramb., San Vito di Norm., Junio, 1905.

Nothochrysa italica Rossi., Nicastro, 3 Agosto 1905. San Vito, Septiembre, 1905.

Sialis lutaria L., Florencia.

Psocus nebulosus Steph., Nicastro, 28 Junio 1905. Me resta alguna leve duda por lo imperfecto del ejemplar único.

Mantispa perla L. var. *brunnea* nov. *Alis membrana brunnea*.

Distínguese del tipo por la coloración más oscura de todo el cuerpo. Las manchas pardas de cabeza, tórax y abdomen, tiran á negro píceo, y el estigma es de color de café rojizo. El tinte del ala es de un color de café claro, algo más acentuado hacia la base, donde amarillea el tipo.

No hallando que se haya dado nombre á esta forma, aunque Hagen ya citó las de alas pardas, me ha parecido denominarla *brunnea*, del color que en ella domina.

Un ejemplar de San Vito, Serranova, 16 Junio 1905.

Raphidia ophiopsis L., San Vito, Mayo, Junio y Julio, 1905.

Panorpa communis L., Portici.

Gramnotaulus atomarius L., Portici.

Micropterna nycterobia M'L., Portici.

Obs. De las 32 formas examinadas, resultan de especial interés las siguientes: *Lestes Dryas*, *Ascalaphus italicus*, *Palpares libelluloides*, *Myrmeleon nemausiensis*, *Chrysopa vulgaris* var. *radialis*, *Nothochrysa italica*, *Mantispa perla* var. *brunnea*, *Gramnotaulus atomarius* y *Micropterna nycterobia*; dignas de ser citadas de las localidades de donde proceden.